



株式会社 赤塚植物園

垣根に
最適!!

PHOTINIA Fraseri cv. "Scalet Pearl"

洋種ペニカナメの 優良選抜種

スカーレットパール

燃えるような真紅の新芽が楽しめる!

レッドロビンとは
ココ^{!!}が違う!!

- ①新葉の色がはるかに鮮やかな紅色で、赤色が長く維持される!
- ②葉が小さく、葉の波打ちやねじれがない!
- ③成長が緩やかで樹形も密に茂る!



株式会社 赤塚植物園

レッドロビンとは **ココ** が違う!!

- ①新葉の色がはるかに鮮やかな紅色で、赤色が長く維持される!
- ②葉が小さく、葉の波打ちやねじれがない!
- ③成長が緩やかで樹形も密に茂る!

洋種ベニカナメの **優良選抜種**

み え
三重カナメ

生育抜群!

生け垣におすすめ!

燃えるような真紅の新芽が魅力です。

ごま色斑点病の防除方法

- 発生時期：初～初夏と秋
- 症状：葉に紅～灰色の斑点が出来て落葉する。

殺菌剤（ベンレート、ダニコールなど）の葉面散布を早春～秋にかけてこまめに行ってください。（特に発芽前が重要）また拡大を防ぐため、病気で落葉した葉はすぐに取り除いてください。

